

# Piramil 10 mg 28 tabletek

Nasza cena: 11,95 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	SANDOZ GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	RAMIPRILUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

- leczenie nadciśnienia tętniczego
- zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego
- zmniejszenie zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych
- leczenie chorób nerek
- początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej
- jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa
- leczenie objawowej niewydolności serca
- prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego
- zmniejszenie umieralności u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolności serca po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego

### Dawkowanie:

#### Zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych:

- zalecana dawka początkowo wynosi 2,5 mg na dobę,

- dawkę należy stopniowo zwiększać,
- zaleca się podwojenie dawki leku po jednym tygodniu leczenia,
- następnie po dalszych trzech tygodniach dawkę należy zwiększyć do 10 mg na dobę.

#### **Nadciśnienie tętnicze:**

- dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę,
- w razie potrzeby można podwoić dawkę po upływie 2 – 3 tygodni.

#### **Leczenie objawowej niecukrzycowej nefropatii kłębkowej:**

- zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę,
- dawkę można zwiększyć dwukrotnie w odstępach 2 – 3 tygodni.

Szczegółowe informacje na temat dawkowania leku zostały zawarte w ulotce. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i pod jego ścisłą kontrolą.

#### **Działanie:**

- prowadzi do zmniejszenia w osoczu krwi stężenia angiotensyny II,
- prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza
- zmniejszenia wydzielania aldosteronu i hamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron.
- wpływ na układ kalikreina-kinina-prostaglandyna.
- obniża ciśnienie tętnicze krwi

#### **Skład:**

1 tabletkę zawiera 10 mg ramiprylu.

#### **Przeciwwskazania:**

**Istnieją różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku. Do najczęstszych z nich należą:**

- nadwrażliwość na ramipryl, na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na inny ACE.
- obrzęk naczynioruchowy związany z leczeniem ACE w wywiadach.
- dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.
- zwężenie obustronne tętnicy nerkowej
- II lub III trymestr ciąży.

#### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania leku mogą występować działania niepożądane. Nie zawsze objawiają się one w taki sam sposób u każdego pacjenta. U niektórych pacjentów działania niepożądane mogą w ogóle nie występować.

- najczęściej suchy,

- uporczywy kaszel nasilający się w nocy i w pozycji leżącej,
- hipotonia,
- sporadycznie suchość w ustach,
- bóle w nadbrzuszu,
- nudności,
- bóle i zawroty głowy,
- zmiany nastroju,
- zaburzenia świadomości,
- poty,
- świąd,
- pokrzywka,
- łysienie.

W celu poznania innych działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.