

Pirolam Intima Vag 500 mg, 1 tabletki dopochwowa



Nasza cena: 28,63 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 MG
Opakowanie	*1
Postać	TABL.DOPOCH.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CLOTRIMAZOLUM

Opis produktu

Opis

Pirolam Intima Vag 500 mg, 1 tabletki dopochwowa

Substancją czynną preparatu leczniczego Pirolam Intima Vag jest **klotrimazol**, [lek przeciwgrzybiczy](#) z grupy pochodnych imidazolu. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków. Działanie klotrimazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba.

Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego, dopochwowo. Po zastosowaniu dopochwowym, wchłanianie klotrimazolu jest niewielkie (3–10% dawki dopochwowej jest wchłaniane do krążenia ogólnoustrojowego).

Wskazania do stosowania

Preparat Pirolam Intima Vag jest wskazany w leczeniu zakażeń pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez grzyby, takie jak drożdżaki, wrażliwe na klotrimazol.

Przeciwwskazania

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pirolam Intima Vag - tabletki dopochwowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Tabletki przeznaczone są wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie wolno ich połykać.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli:

- do zakażenia doszło po raz pierwszy
- w ciągu ostatniego roku wystąpiły 4 zakażenia lub więcej
- temperatura jest podwyższona (38°C lub wyższa)
- występuje ból w dolnej części brzucha lub pleców
- występują cuchnące upławy
- występują nudności
- występuje krwawienie z dróg rodnych lub/i ból ramion.

Równoległe z preparatem nie należy stosować innych produktów do stosowania dopochwowego (w tym tamponów).

W okresie zakażenia należy unikać stosunków płciowych, ponieważ zakażenie może być przeniesione na partnera.

Preparat może zmniejszać skuteczność środków antykoncepcyjnych (takich jak lateksowe prezerwatywy i krążki dopochwowe).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu preparatu Pirolam Intima Vag na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Dawkowanie

Preparat Pirolam Intima Vag ma postać tabletek dopochwowych. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami.

Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.

Dorośli i młodzież po ukończeniu 16. roku życia: jednorazowo, 1 tabletkę dopochwową, wieczorem.

Jeżeli po 7 dniach od jednorazowego zastosowania preparatu nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

Młodzież 12–15 lat:

U młodzieży do 16 lat (po pierwszej miesiączce) preparat może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem i na jego zlecenie.

Dzieci do 12 lat:

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego i danych dotyczących bezpieczeństwa, preparatu nie należy stosować u dzieci do ukończenia 12. roku życia.

Sposób podawania

Tabletkę należy wprowadzić głęboko dopochwowo, stosować wieczorem, przed spoczynkiem nocnym.

Nie należy stosować w trakcie miesiączki; stosowanie preparatu należy zakończyć przed rozpoczęciem krwawienia miesięczkowego.

Jeżeli u partnera seksualnego występują objawy, takie jak np. świąd czy stan zapalny, powinien on także poddać się leczeniu miejscowemu.

Stosowanie Pirolam Intima Vag - tabletki dopochwowe w okresie ciąży i karmienia piersią

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Zaleca się unikanie stosowania preparatu w I trymestrze ciąży.

Nie ma danych dotyczących przenikania klotrimazolu do mleka kobiety karmiącej. Należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia.

Interakcje z innymi lekami

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie klotrimazolu dopochwowo równoległe ze stosowanym doustnie takrolimusem lub syrolimusem (leki immunosupresyjne) może prowadzić do zwiększenia stężenia leków immunosupresyjnych w osoczu. Należy uważnie obserwować, czy nie występują objawy przedawkowania takrolimusu lub syrolimusu, a w razie potrzeby kontrolować ich stężenie w osoczu.

Klotrimazol zmniejsza aktywność izoenzymów 3A4 i 2C9 cytochromu P450, co może mieć wpływ na stężenie i działanie niektórych leków metabolizowanych z udziałem tych izoenzymów. Jednak, ponieważ preparat jest stosowany miejscowo i jego ogólnoustrojowa dostępność jest ograniczona (3-10% dawki dopochwowej jest wchłaniane), jest mało prawdopodobne aby tego typu interakcje z innymi lekami miały znaczenie kliniczne. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Substancje zawarte w preparacie mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne i zmniejszać ich skuteczność.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, również Pirolam Intima Vag może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często możliwe miejscowe podrażnienie (pieczenie). Niezbyt często ból brzucha, świąd, rumień i podrażnienie. Rzadko reakcje nadwrażliwości, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z dróg rodnych. Może wystąpić złuszczenie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.