

Polcrom, 2%, aerozol do nosa, 15 ml



Nasza cena: 18,96 zł

Opis słownikowy

Dawka	2 %
Opakowanie	15ml
Postać	AER.DO NOSA
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM CROMOGLICICUM

Opis produktu

Opis

Polcrom jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym kromoglikian sodu. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu nie dochodzi do wystąpienia reakcji alergicznych.

Dawkowanie - Polcrom, 2%, aerozol do nosa, 15 ml

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat - 1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.

Stosowanie leku należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.

Stosowanie sodu kromoglikianu jest leczeniem zapobiegawczym. Lek należy stosować regularnie.

Składniki - Polcrom, 2%, aerozol do nosa, 15 ml

1 ml roztworu zawiera jako substancję czynną: 20 mg sodu kromoglikianu oraz substancje pomocnicze: sorbitol, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbitat 80, benzalkoniowy chlorek roztwór, wodę oczyszczoną.

Wskazania - Polcrom, 2%, aerozol do nosa, 15 ml

Lek stosuje się zapobiegawczo w leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego nieżyty nosa.

Przeciwwskazania - Polcrom, 2%, aerozol do nosa, 15 ml

Nie należy stosować leku Polcrom 2% jeśli - stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na sodu kromoglikian lub inne składniki leku.

Przeciwwskazania - Polcrom, 2%, aerozol do nosa, 15 ml

Jak każdy lek, Polcrom 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z nosa. Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne. U niektórych osób w czasie stosowania leku Polcrom 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Uwagi

Stosowanie leku Polcrom 2% u dzieci:
Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, mimo że jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego i wywierał działania niepożądane na dziecko karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Cała prawda o alergii

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.