

Poldanen 30 tabletek



Nasza cena: 31,40 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Dawka | 46MG |
| Opakowanie | *30 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | SITOSTEROLUM, PYGEUM AFRICANUM |

Opis produktu

Opis

Poldanen

Pruni africanae corticis extractum spissum

46 mg, tabletki powlekane

Substancja czynna:

1 tabletkę zawiera 46 mg wyciągu gęstego z *Prunus africana* (Hook f.) Kalkm., cortex (kora śliwy afrykańskiej) (200:1), ekstrahent: chlorek metylenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza - 82,5 mg, żółcień pomarańczowa lak E 110 - 1,1 mg.

Wskazania do stosowania

Produkt stosuje się wyłącznie u mężczyzn wspomagająco w zaburzeniach oddawania moczu występujących we wczesnym stadium przerostu gruczołu krokowego – I i II stopień wg Alcena (częstomocz, konieczność oddawania moczu w nocy, utrudnienie oddawania moczu, oddawanie moczu kroplami).

Dawkowanie i sposób podawania

Stosować doustnie, 2 razy dziennie po 2 tabletki w czasie posiłku, przez co najmniej 4 tygodnie. W razie potrzeby kurację można powtórzyć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wyciąg z kory śliwy afrykańskiej lub na rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt nie może być stosowany u pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu nie zwalnia od stałej konsultacji z urologiem. Produkt nie wpływa na wielkość gruczołu krokowego, łagodzi tylko dolegliwości związane z jego przerostem. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią, lub w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, nagłego zatrzymania moczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Lek zawiera także barwnik – żółcień pomarańczową lak E 110, który może wywołać reakcje alergiczne.

Działania niepożądane

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dlatego zaleca się przyjmowanie produktu w trakcie posiłku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.