

# Polocard 150 mg, 60 tabletek powlekanych

Nasza cena: 25,90 zł



## Opis słownikowy

Dawka	150 MG
Opakowanie	*60
Postać	TABL.POWL.DOJEL.
Producent	ZENTIVA K.S. CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

## Opis produktu

### Opis

## Polocard 150 mg, 60 tabletek powlekanych

Preparat stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia oraz innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

## Dawkowanie - Polocard 150 mg, 60 tabletek powlekanych

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletkę 150 mg na dobę.

## Składniki - Polocard 150 mg, 60 tabletek powlekanych

### 1 tabletkę zawiera:

substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 150 mg,  
substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek, talk, sodu laurylosiarczan, lak z czerwieni koszenilową E-124, krzemionka koloidalna, sodu wodorowęglan.

## Działania

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

## Wskazania - Polocard 150 mg, 60 tabletek powlekanych

- w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;
- w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

## Przeciwwskazania - Polocard 150 mg, 60 tabletek powlekanych

### Nie stosować leku Polocard:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne NLPZ przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs.
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenie układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny, heparyna),
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6- fosforanowej
- jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny.
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu
- w ostatnim trymestrze ciąży.

Jak każdy lek, Polocard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Zaburzenia żołądka i jelit
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
- Zawroty głowy i szumy uszne, zaburzenia słuchu
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych
- Niewydolność serca
- Nadciśnienie tętnicze
- Zaburzenia krwi i układu chłonnego
- Zaburzenia układu immunologicznego.

## Uwagi

### Ciąża i karmienie piersią:

Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki i skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu**

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**