

Polopiryna Max, tabletki dojelitowe x 10

Nasza cena: 10,02 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*10
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Polopiryna max przeznaczona do stosowania przy bólach o lekkim nasileniu tj. bóle głowy, bóle zębów, bóle stawów, bóle mięśni. Stosowana również jako uśmierzenie dolegliwości towarzyszących przeziębieniu i grypie, oraz w stanach chorobowych wymagających długotrwałego leczenia kwasem acetylosalicylowym przyjmowanym w dużych ilościach tj. reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza)

Dzięki zawartości kwasu acetylosalicylowego polopiryna max ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Poprzez to, że występuje w postaci dojelitowej, rozkłada się dopiero w jelicie cienkim, dzięki temu nie podrażnia błon śluzowych żołądka.

Dawkowanie:

Tabletkę należy przyjmować podczas posiłku lub tuż po nim, nie rozgryzać, popijać dużą ilością wody.

- W stanach bólowych i gorączce u osób dorosłych należy przyjmować ok. 1 – 2 tabletek (500 – 1000mg) w razie konieczności powtórzyć 2 – 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 3g leku na dobę

- Młodzież w wieku powyżej 16 lat wyłącznie na zalecenie lekarza 500 – 1000mg (1 – 2 tabletki) na dobę

Leczenie objawowe można prowadzić nie dłużej niż 3 dni

W leczeniu chorób reumatycznych tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem:

- w gorączce reumatycznej 2 tabletki 4 razy na dobę (4000mg)

- w reumatoidalnym zapaleniu stawów 1 tabletkę 3 lub 4 razy na dobę (2000mg)

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku:

- jeżeli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy bądź którykolwiek ze składników

- u osób chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa.

- jeżeli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca

- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi
- w przypadku, gdy pacjent ma mniej niż 16 lat

Leku nie powinny stosować kobiety III trymestrze ciąży, w I i II trymestrze lek można przyjmować jedynie pod ścisłym nadzorem lekarza, jedynie w nagłych wypadkach, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.