

# Polopiryna S, 20 tabletek

Nasza cena: 10,43 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

## Opis produktu

### Opis

## Polopiryna S, 20 tabletek

Polopiryna S zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

### Dawkowanie - Polopiryna S, 20 tabletek

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z dużą ilością płynu. Tabletkę przed użyciem można również rozpuścić w 1/2 szklanki wody lub mleka. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni. Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

- przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwykle stosuje się: dorośli: od 300mg do 600mg (od 1 do 2 tabletek) co 4 godziny. Nie przyjmować więcej niż 3 g leku na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 600mg do 900mg (od 2 do 3 tabletek) na dobę,
- w chorobach reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza, najczęściej stosuje się: w gorączce reumatycznej: 900mg (3 tabletki) 4 razy na dobę; w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 600mg (2 tabletki) od 3 do 4 razy na dobę,
- zawał mięśnia sercowego, profilaktyka zawału mięśnia sercowego: od 150mg do 300mg na dobę.

### Składniki - Polopiryna S, 20 tabletek

1 tabletkę:

substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 300mg,

substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza sproszkowana, celuloza mikrokryształiczna.

### Działania

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

## Wskazania - Polopiryna S, 20 tabletek

- Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów,
- dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką,
- stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza),
- zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego.

## Przeciwwskazania - Polopiryna S, 20 tabletek

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub inne NLPZ; astma oskrzelowa; przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa; czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz stany zapalne i krwawienia z przewodu pokarmowego; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; zaburzenia krzepliwości krwi; gdy pacjent jest jednocześnie leczony środkami przeciwzakrzepowymi; niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; jednoczesne przyjmowanie metrotreksatu; dzieci poniżej 12 lat; ostatni trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

## Przeciwwskazania - Polopiryna S, 20 tabletek

- Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, zgada, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje.
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby.
- Zaburzenia układu nerwowego: szumy uszne zazwyczaj jako objaw przedawkowania, zaburzenia słuchu, zawroty głowy.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.
- Zaburzenia serca: niewydolność serca.
- Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie.
- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu protrombinowego.
- Zaburzenia układu immunologicznego: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**