

Polpril 10 mg 28 kapsułek

Nasza cena: 11,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 MG
Opakowanie	*28
Postać	KAPS.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	RAMIPRILUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- leczenie nadciśnienia tętniczego,
- zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych,
- początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej,
- jawna nefropatia cukrzycowa,
- profilakcja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca.

Dawkowanie:

Sposób użycia oraz dawkowanie leku powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego. Dawkowanie leku ustalone jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu bądź też badań profilaktycznych. Pacjent powinien stosować się ściśle do zaleceń lekarza.

- zazwyczaj stosuje się dawkę początkową wynoszącą 1,25 mg do 2,5 mg.
- dawkę można zwiększać w odstępach czasowych wynoszących od 1 do 4 tygodniach
- maksymalna dawka dobową nie powinna przekraczać 10mg

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży powinno zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym.

Działanie:

- obniża ciśnienie tętnicze krwi

Skład:

1 kapsułka zawiera 10 mg ramiprylu.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- obrzęk naczynioruchowy,
- pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi,
- istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy do jedynej czynnej nerki,
- II i III trymestr ciąży,
- u pacjentów z hipotonią i niestabilnych hemodynamicznie,
- u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane mogą objawiać się tylko u części pacjentów przyjmujących produkt.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- zaburzenia widzenia,
- nieproduktywny, drażniący kaszel,
- zapalenie oskrzeli,
- zapalenie zatok przynosowych,
- duszność,
- zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego,
- zaburzenia trawienia,
- dyskomfort w jamie brzusznej,
- dyspepsja,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,

- wysypka,
- skurcze mięśni,
- bóle mięśniowe,
- podwyższone stężenie potasu we krwi,
- niedociśnienie,
- hipotonia ortostatyczna,
- omdlenie,
- ból w klatce piersiowej,
- zmęczenie.

Należy zauważyć, iż powyżej została wymieniona jedynie część działań niepożądanych. Jeżeli u klienta występują inne niepokojące objawy należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.