

Polsart 80 mg 28 tabletek

Nasza cena: 18,38 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Dawka | 0,08 G |
| Opakowanie | *28 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek na receptę |
| Substancja czynna | TELMISARTANUM |

Opis produktu

Opis

Wskazania

Lek jest zalecany do stosowania podczas :

- nadciśnienie tętnicze
- zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
- zmniejszenie częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych lub cukrzycą typu 2

Dawkowanie

Lek stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego
Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego: zalecana dawka wynosi 40 mg raz/dobę.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zalecana dawka to 80 mg raz/dobę.
Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Działanie

Substancją czynną preparatu to telmisartan, który jest wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typ AT1).

Lek obniża wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Zmniejszenie częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak zawał serca lub udar mózgu.

Skład

1 tabletkę zawiera 80 mg telmisartanu

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną telmisartan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zawartą w leku.

Nie stosować w II i III trymestr ciąży.

Dodatkowo nie należy stosować leku gdy wystąpiły zaburzenia w odpływie żółci, ciężka niewydolność wątroby.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą pojawić się działania niepożądane takie jak : duszność, zawroty głowy, depresja, bezsenność, omdlenie, zakażenie górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie gardła i zapalenie zatok, zapalenie pęcherza moczowego, zaburzenia wątroby i dróg żółciowych.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.