

Poltram 50 mg 20 kapsułek

Nasza cena: 3,67 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*20
Postać	KAPS.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TRAMADOLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w celu walki z bólem o średnim i dużym natężeniu.

Dawkowanie:

- dawkę leku należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od intensywności bólu oraz jego indywidualnych reakcji na działanie leku,
- istotne jest, aby podawać najmniejszą skuteczną dawkę,
- najmniejsza zalecana dawka jaka powinno się zastosować wynosi 50 mg,
- kolejne dawki 50 mg lub 100 mg powinny być podawane nie częściej niż co 4 godziny,
- czas trwania terapii powinien być możliwie najkrótszy,
- dawka dobową nie powinna być większa niż 400 mg.

Działanie:

Lek Poltram wykazuje działanie przeciwbólowe.

Skład:

1 kapsułka zawiera 50 mg chlorowodoru tramadolu.

Przeciwwskazania:

Mogą istnieć różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku Poltram.

Do najczęstszych z nich należą:

- stwierdzona nadwrażliwość na tramadol lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- w ostrym zatruciu: alkoholem, lekami przeciwbólowymi, nasennymi, przeciwbólowymi opioidowymi lub psychotropowymi,
- w leczeniu uzależnień od opioidów,
- u pacjentów z padaczką nieodpowiednio kontrolowaną lekami.

Działania niepożądane:

Wszelkie niezbędne informacje na temat działań niepożądanych zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- zawroty głowy,
- bóle głowy,
- senność,
- nudności,
- wymioty,
- zaparcia,
- biegunka,
- suchość w jamie ustnej,
- nadmierna potliwość.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.