

Poltram Combo 37,5/325 mg 20 tabletek

Nasza cena: 2,25 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,0375G+0,325G
Opakowanie	*20
Postać	TABL.POWL.
Producent	Polpharma S.a. Starogard Gdański
Rejestracja	Lek na receptę

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Dawkowanie:

- stosowanie produktu leczniczego należy ograniczyć jedynie do dla pacjentów z bólem o umiarkowanym i dużym nasileniu,
- dawka leku powinna zostać ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta biorąc pod uwagę nasilenie bólu,
- zaleca się podawanie najmniejszej skutecznej dawki, która uśmierzy ból,
- dawka początkowa powinna wynosić 2 tabletki produktu (co odpowiada 75 mg tramadolu i 650 mg paracetamolu).
- w razie konieczności można przyjąć kolejne dawki, nie przekraczając 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę,
- minimalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 6h.

Działanie:

Produkt dzięki zawartym w swoim składzie substancją wykazuje działanie przeciwbólowe.

Skład:

1 tabletki powlekana zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

Przeciwwskazania:

Produktu nie należy stosować jeżeli u pacjenta występują dolegliwości takie jak:

- nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.
- ciężka niewydolność wątroby.
- padaczka oporna na leczenie.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Objawiają się one u blisko 10% pacjentów.

Najczęściej występują one w postaci:

- nudności,
- zawroty głowy,
- senność,
- splątanie,
- zmienność nastrojów,
- lęk,
- nerwowość,
- euforia,
- zaburzenia snu,
- ból głowy,
- drżenie,
- wymioty,
- zaparcie,
- suchość w jamie ustnej,
- biegunka,
- ból brzucha,
- niestrawność,
- wzdęcia,
- nadmierna potliwość,
- świąd.

Należy zauważyć, iż przebieg oraz intensywność działań niepożądanych może różnić się w zależności od pacjenta. Dlatego też jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie jakiegokolwiek z działań niepożądanych powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.