

Poltram Combo 37,5/325 mg 60 tabletek

Nasza cena: 5,24 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,0375G+0,325G
Opakowanie	*60
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TRAMADOLUM, PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Poltram Combo 37,5/325 mg, 60 tabletek

Wskazania do stosowania Poltram Combo:

Poltram Combo jest to produkt leczniczy stosowany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Zalecany jest osobom dorosłym oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Lek przepisywany jest przez lekarza, do którego należy decyzja o zasadności zastosowania tego preparatu. Zastosowywanie leku ograniczane jest do stosowania u pacjentów z bólem umiarkowanym i dużym, co do których wymagane jest stosowanie leku z połączeniem tramadolu z paracetamolem.

Dawkowanie:

Dawkę ustala indywidualnie lekarz na podstawie nasilenia bólu, który dolega pacjentowi.

Dorośli i młodzież od 12 roku życia:

Dawka początkowa to 2 tabletki (75 mg tramadolu i 650 mg paracetamolu). W razie konieczności należy przyjąć kolejne dawki. Należy uważać żeby nie przekroczyć 8 tabletek na dobę (300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu). Należy zachować 6 godzinny odstęp między dawkami.

U dzieci i młodzieży poniżej 12-go roku życia skuteczność produktu nie została ustalona, dlatego nie należy podawać leku w tej grupie wiekowej.

U pacjentów powyżej 75 roku życia lekarz indywidualnie ustala przebieg leczenia.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 37,5 mg chlorowodoru tramadolu i 325 mg paracetamolu.

Działanie:

Substancja tramadol jest analgetykiem o działaniu na OUN. Tramadol to nieselektywny, czysty agonista receptorów opioidowych. Kolejne mechanizmy, które przyczyniają się do zwiększenia jego skuteczności to zahamowanie neuronalnego wychwyty zwrotnego noradrenaliny oraz zwiększenie uwalniania serotoniny. Tramadol wykazuje również działanie przeciwkaszlowe. Wpływ Poltramu Combo na układ krążenia jest zazwyczaj minimalny. Tramadol wykazuje się siłą, która jest określana na 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Paracetamol i jego działanie przeciwbólowe.

Mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu nie jest dokładnie znany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na tramadol
- nadwrażliwość na paracetamol
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą
- ostre zatrucie alkoholem
- zatrucie lekami nasennymi
- ostre zatrucie lekami przeciwbólowymi
- zatrucie lekami psychotropowymi
- ciężka niewydolność nerek
- ciężka niewydolność wątroby
- padaczka oporna na leczenie
- nie można stosować w połączeniu z innymi lekami, które lekarz określi jako wykluczające stosowanie

Działania niepożądane:

Szczegółowa lista działań niepożądanych znajduje się w ulotce leku.

Do najczęściej zgłaszanych zaliczamy:

- nudności
- zawroty głowy
- senność
- zaburzenia psychiczne
- zaburzenia układu nerwowego
- zaburzenia żołądka i jelit

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.