

Polvertic 24 mg 60 tabletek

Nasza cena: 67,21 zł

Opis słownikowy

Dawka	24MG
Opakowanie	*60 (6 BLIST. PO 10 TABL.)
Postać	Tabletki
Producent	MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	BETAHISTINE

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany w leczeniu choroby Ménière'a charakteryzującej się takimi objawami jak:

- zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami),
- postępująca utrata słuchu,
- szумы uszne.

Innym wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Leczenie jest dostosowywane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zazwyczaj zaleca się stosowanie początkowo od 8 do 16 mg leku do 3 razy na dobę, lek przyjmuje się podczas posiłku. Pozytywne efekty stosowania leku zostają odnotowane po upływie kilku tygodni leczenia.

Działanie:

- poprawia krążenie krwi,
- zwiększa przepływ krwi w mózgu,

- przyspiesza powrót prawidłowej funkcji przedsionka
- wykazuje działanie hamujące na generowanie impulsów iglicowych przez neurony jąder przedsionkowych bocznego i przyśrodkowego.

Skład:

1 tabletkę zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodoru.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu jeżeli u któregośkolwiek z pacjentów występują dolegliwości takie jak:

- nadwrażliwość na betahistynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- guz chromochłonny nadnerczy.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Do najczęstszych z nich należą:

- nudności i zaburzenia trawieni,
- łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
- bóle głowy,
- anafilaksja,
- wysypkę,
- świąd,
- pokrzywkę.

Działania które zostały przedstawione nie muszą występować u wszystkich pacjentów i objawiać się w taki sam sposób. Jeżeli którekolwiek z działań wystąpią u pacjenta należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.