

Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 sztuk

Nasza cena: 38,17 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	CZOPKI
Producent	DR KADE NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCHERICHIA COLI

Opis produktu

Opis

Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 sztuk

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzania świądu oraz pieczenia.

Dawkowanie - Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Lek Posterisan należy zawsze skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosuje się czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy.

Składniki - Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.

1 czopek: 387,1mg wodnej zawiesiny martwych bakterii (w skład zawiesiny wchodzi składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 660mln bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych maksymalnie 6,6mg rozcieńczonego fenolu).

Działania

- Uśmierza ból,
- eliminuje świąd i pieczenie,
- zapobiega krwawieniom,
- wpływa na miejscową regenerację tkanek oraz gojenie się ran,
- zwiększa odporność chorych miejsc na zakażenie bakteryjne,
- wskazany także przy szczelinach (bolesnych pęknięciach) i przetokach w kanale odbytu.

Wskazania - Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Czopki Posterisan stosuje się w świądzie, sączeniu i pieczeniu okolicy odbytu.

Przeciwwskazania - Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przeciwwskazania - Posterisan, czopki doodbytnicze, 10 szt.

W razie szczególnej nadwrażliwości na fenol może dojść do skórnych reakcji alergicznych powodujących zaczerwienienia i świąd.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania produktu w czasie ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.