

Preductal MR 35 mg 60 tabletek

Nasza cena: 38,47 zł

Opis słownikowy

Dawka	35MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	ANPHARM S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRIMETAZIDINUM

Opis produktu

Opis

Preductal MR 35 mg 60 tabletek

Wskazania:

w kardiologii: długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca - zapobieganie napadom dławicy piersiowej, w skojarzeniu z innymi lekami.

w otolaryngologii: leczenie ślimakowo-przedsionkowych zaburzeń wywołanych niedokrwieniem, takich jak zawroty głowy, szumy uszne, niedosłuch.

Dawkowani:

Zwykle stosuje się 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku 2 razy na dobę: po 1 tabl. rano i wieczorem, podczas posiłków; tabletkę należy popić szklanką wody. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku lub przed zabiegiem chirurgicznym.

Działanie:

Lek wykazuje cytoprotekcyjne działanie trimetazydyny przez ochronę struktur i funkcji komórek należących do różnych tkanek i narządów przed skutkami niedotlenienia i niedokrwienia; zapobiega zmniejszeniu stężenia wewnątrzkomórkowego ATP, przedłuża prawidłowe funkcjonowanie pompy sodowo-potasowej i homeostazę komórek.

Skład:

1 tabletko o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na trimetazydyne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu

Działania niepożądane:

Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- zaburzenia układu nerwowego w postaci zawrotów i bólu głowy
- zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty;
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka;
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia.

Lista szczegółowa działań niepożądanych w dołączonej do opakowania ulotce.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.