

Probeven 750 mg, 60 tabletek

Nasza cena: 79,44 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,75 G
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	Proenzi S.r.o Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Probeven 750 mg to lek stosowany w celu łagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, łagodne do umiarkowanego.

Substancją czynną jest siarczan glukozaminy. Każda tabletkę zawiera siarczan glukozaminy 942 mg x chlorku sodu, co odpowiada 750 mg siarcznanu glukozaminy 589 mg i glukozaminy.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest formą wspólnego degeneracji, której objawy są sztywność (po śnie lub odpoczynku rozszerzony), ból podczas ruchu (np wchodzenie po schodach lub chodzenia po nierównych powierzchniach).

Proenza Probeven 750 mg jest sprzedawany za pośrednictwem sieci publicznych aptekach bez recepty.

1. Przed zażyciem Probeven

Przeciwwskazania - Probeven 750 mg, 60 tabletek:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na:

- Glukozamina lub którykolwiek z pozostałych składników Probeven.
- Skorupiaki, ponieważ Probeven jest wykonane z muszli.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania Probeven

- Upośledzenie tolerancji glukozy. Zaleca się częściej kontrolować poziom cukru we krwi na początku leczenia Probeven.
- Spadek funkcji nerek lub wątroby, ponieważ na tej grupie pacjentów, nie przeprowadzono badań, nie może być żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.
- u osób cierpiących na choroby układu krążenia, ponieważ u pacjentów leczonych Probeven, w niektórych przypadkach, została

zgłoszona hipercholesterolemii.

- Cierpiących na astmę na astmę. Kiedy rozpocząć leczenie z Probeven, trzeba mieć możliwość nasilenia objawów astmy.

Dawkowanie - Probeven 750 mg, 60 tabletek

Tablet Probeven należy podawać dwa razy dziennie lub dwie tabletki raz na dobę Probeven. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Probeven nie jest wskazany w leczeniu ostrego bólu (silny ból krótki zainstalowany szybko). Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) może nie być oczywiste, aż po kilku tygodniach leczenia, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Jeśli po 2-3 miesiącach leczenia nie są rejestrowane bez poprawy objawów, w trakcie leczenia należy ponownie ocenić i zaciągnąć porady.

Przeciwwskazania - Probeven 750 mg, 60 tabletek

Jak każdy lek, Probeven może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Probeven i zobaczyć się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak obrzęk twarzy, języka i/lub gardła i / lub trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.