

Proctanal Enema wlewka doodbytnicza, 120 ml (butelka)

Nasza cena: 12,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	120 ML (BUTELKA)
Producent	MIRALEX SP.Z.O.O. POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny



Opis produktu

Opis

Proctanal Enema wlewka doodbytnicza 120 ml (butelka)

Proctanal Enema wlewka doodbytnicza, przesuwa masę kałową, ułatwia wypróżnianie.

wyrób medyczny

Składniki

Butelka zawiera: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sól sodowa p-oksybenzoesanu metylu, woda oczyszczona

Sposób użycia

Dorośli i młodzież (12-18 lat): 1 lewatywa ze 120 ml. Należy stosować jedną lewatywę dziennie.

Wlewka doodbytnicza Proctanal Enema może być stosowana w temperaturze pokojowej. W przypadku preferowania stosowania ciepłych wlewek, wystarczy umieścić wlewkę w ciepłej wodzie (poprzez zanurzenie lub w strumieniu wody pod kranem). W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy położyć się na lewym boku. Należy usunąć opaskę ochronną z aplikatora doodbytniczego, ściągnąć osłonkę z butelki i nałożyć aplikator.

Chwycić butelkę, delikatnie wsunąć aplikator do odbytu i powoli wycisnąć całą zawartość butelki. Po zakończeniu aplikacji, należy pozostać w pozycji leżącej do momentu poczucia silnej potrzeby wypróżnienia, która zazwyczaj następuje w ciągu 5 minut.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Wlewka doodbytnicza nie może być stosowana w przypadku chronicznych bólów brzucha lub bólów nieznanego pochodzenia.

Skutki uboczne stosowania wyrobu

Może powodować bóle brzucha oraz biegunkę u osób wrażliwych.

Ostrzeżenia

Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu w temperaturze pomiędzy 4 - 30C.
Produkt do jednorazowego użytku.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.