

Procto-Hemolan Control, 1000 mg, 20 tabletek

Nasza cena: 23,21 zł



Opis słownikowy

Dawka	1G
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIOSMINUM

Opis produktu

Opis

Procto-Hemolan Control, 1000 mg, 20 tabletek

Preparat stosowany w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żyłkami odbytu (hemoroidy).

Dawkowanie - Procto-Hemolan Control, 1000 mg, tabletki, 20 szt.

Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejny 3 dni.

Składniki - Procto-Hemolan Control, 1000 mg, tabletki, 20 szt.

Substancją czynną leku jest diosmina. jedna tabletkę zawiera 1000mg diosminy. Inne składniki leku to: alkohol poliwinylowy, kroscarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Działania

Lek ten zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania - Procto-Hemolan Control, 1000 mg, tabletki, 20 szt.

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Przeciwwskazania - Procto-Hemolan Control, 1000 mg, tabletki, 20 szt.

Uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Ciąża i karmieni piersią.

Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na diosminę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Lek ten może być stosowany w czasie ciąży jedynie jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie za zgodą lekarza. W związku z tym, że brak jest danych na temat przenikalności leku do mleka matki, leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.