

Procto-Hemolan, krem 20g

Nasza cena: 24,40 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	20g
Postać	KREM
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TRIBENOSIDUM, LIDOCAINUM

Opis produktu

Opis

Procto-Hemolan, krem 20g

Procto-Hemolan szybko przynosi ulgę.

-Procto-Hemolan krem zawiera lidokainę, która wykazuje silne działanie znieczulające. Dzięki temu bardzo szybko likwiduje ból, pieczenie i swędzenie.

-Zapobiega nawrotom choroby

Procto-Hemolan krem zawiera tribenozyd, który zwalcza stan zapalny i obrzęki, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna. W ten sposób zwalcza przyczyny dolegliwości i zabezpiecza przed ich ponownym wystąpieniem.

Pełna informacja o produkcie

Procto-Hemolan, krem doodbytniczy 20g.

Skład:

Tribenozyd 5g, Chlorowodorek lidokainy 2g.

Wskazania:

zewnątrzne i wewnętrzne żylaki odbytu; miejscowe leczenie hemoroidów.

Sposób użycia i dawkowanie:

Lek należy stosować doodbytniczo. Za pomocą aplikatora nakładać preparat na miejsce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem. Po ustąpieniu ostrych objawów preparat można stosować jeden raz na dobę.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, a w szczególności stwierdzona nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające (stosowane np. do znieczuleń w stomatologii).

Ostrzeżenia specjalne:

Brak reakcji na leczenie po 7 dniach stosowania preparatu lub zaostrzenie objawów chorobowych jest wskazaniem do skonsultowania się z lekarzem w celu określenia przyczyny schorzenia.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Procto-Hemolan może powodować działania niepożądane. Rzadko, bezpośrednio po zastosowaniu może wystąpić uczucie lekkiego pieczenia, bólu lub nasilona perystaltyka jelit. U niektórych osób w czasie stosowania leku Procto-Hemolan mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.