

Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 sztuk



Nasza cena: 31,37 zł

Opis słownikowy

Dawka	2 G
Opakowanie	*10
Postać	CZOPKI
Producent	FARMA DERMA WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 sztuk

Proktis-M czopki doodbytnicze wykazują skuteczność dzięki obecności kwasu hialuronowego, mukopolisacharydu, który występuje w wielu tkankach ciała. Kwas hialuronowy pełni rolę podpory strukturalnej zapewniając napięcie, trofizm i elastyczność tkanek. Zdolność kwasu hialuronowego do przyspieszania i poprawy procesu gojenia i regeneracji tkanek wykazano w licznych badaniach klinicznych.

Dawkowanie - Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Stosować 1 czopek wieczorem lub według wskazań lekarza. Czas stosowania zależy od rozwoju objawów. W razie konieczności czopki doodbytnicze mogą być stosowane przez dłuższy czas.

Składniki - Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Sól sodowa kwasu hialuronowego 5mg, Centella asiatica - wyciąg olejowy, wyciąg olejowy z nagietka, wyciąg olejowy z aloesu, olejek z drzewa herbacianego, glicerydy półsyntetyczne, BHT.

Działania

Czopki regenerują błonę śluzową i przyspieszają gojenie ran w kanale odbytu i odbytnicy.

Wskazania - Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Jako środek wspomagający proces regeneracyjny błony śluzowej kanału odbytu i odbytnicy po zabiegach i operacjach chirurgicznych, w chorobie hemoroidalnej przy wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidach, w stanach zapalnych odbytu i odbytnicy, w zapaleniach krypt, pęknięciach i szczelinach odbytu, przetokach okołoodbytniczych.

Przeciwwskazania - Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Przeciwwskazania - Proktis-M, 2g, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Długotrwałe stosowanie może wywołać reakcje nadwrażliwości.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.