

Proktosedon czopki doodbytnicze, 12 sztuk

Nasza cena: 39,92 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	CZOPKI
Producent	POLMEX W-WA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HYDROCORTISONUM, CINCHOCAINUM, AESCULINU

Opis produktu

Opis

Proktosedon czopki doodbytnicze, 12 sztuk

Skład jakościowy i ilościowy:

Jeden czopek zawiera:

- 5 mg hydrokortyzonu w postaci octanu (Hydrocortisonum)
- 5 mg chlorowodoru cynchokainy (Cinchocaini hydrochloridum)
- 10 mg siarczanu neomycyny (Neomycini sulfas)
- 10 mg eskuliny w postaci półtorawodzianu (Esculinum)

Substancja pomocnicza:

Tłuszcz twardy (Witepsol)

Właściwości farmakodynamiczne:

Hydrokortyzon jest głównym kortykosteroidem wydzielanym przez korę nadnerczy.

Po podaniu miejscowym działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo.

Hydrokortyzon jest farmakologicznie czynny, w odróżnieniu od kortyzonu, który dopiero w wątrobie jest przekształcany do postaci czynnej – hydrokortyzonu. Choć hydrokortyzon wykazuje szereg działań niepożądanych na skórę, należy wziąć pod uwagę, że jego właściwości mogą się nieco zmieniać w zależności od postaci leku, składu substancji pomocniczych oraz innych czynników mogących wpływać na stopień wchłaniania z miejsca podania, w tym stopień uszkodzenia skóry lub błon śluzowych.

Neomycyna jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania, stosowanym miejscowo w leczeniu zakażeń skóry, wywołanych przez wrażliwe szczepy gronkowców i innych drobnoustrojów. Antybiotyk ten prawdopodobnie hamuje syntezę białek wrażliwych drobnoustrojów, wiążąc się z podjednostkami rybosomów. Działa na wiele szczepów bakterii Gram-ujemnych, w tym *Campylobacter* (*Citrobacter*) spp., *Escherichia* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Providencia* spp., *Pseudomonas* spp. i *Serratia* spp.

Cynchokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym o budowie amidowej, stosowanym w znieczuleniu powierzchniowym i dokanałowym. Jest jednym z najsilniej i najdłużej działających, ale i najbardziej toksycznych środków miejscowo znieczulających.

Eskulina hamuje krwawienia z naczyń i zmniejsza obrzęki. Lek zmniejsza objawy występujące w żylakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, świąd, obrzęk i krwawienie.

Stosowanie:

Proktosedon należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zwykle stosuje się jeden czopek rano, jeden wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Proktosedon jest za mocne lub za słabe lub w przypadku braku skuteczności, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania:

Rozerwać opakowanie czopka, wyjąć czopek i wsunąć go delikatnie w odbyt zaostrozonym końcem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.