

Proktosedon, maść 15 g



Nasza cena: 27,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15g
Postać	MASC
Producent	MSD POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CINCHOCAINUM, AESCULINUM, HYDROCORTISONU

Opis produktu

Opis

Proktosedon, maść 15 g

Proktosedon - maść doodbytnicza na hemoroidy jest lekiem o skojarzonym działaniu składników tj. octan hydrokortyzonu, chlorowoderek cynchokainy, siarczan neomycyny, półtorawodzian eskuliny.

Wskazania

Maść Proktosedon jest wskazana w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczeliny odbytu i świądzie odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym.

Działanie

Hydrokortyzon działa przeciwzapalnie, cynchokaina miejscowo znieczulająco. Neomycyna - antybiotyk o szerokim działaniu, zapobiega wtórnym zakażeniom i leczy miejscowe zakażenia wywołane przez gronkowce i wrażliwe bakterie Gram-ujemne. Eskulina hamuje krwawienie z naczyń i zmniejsza obrzęki. Lek zmniejsza objawy występujące w żyłakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, świąd, obrzęk i krwawienie.

Dawkowanie

Proktosedon należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Stosować przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego.

Za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.

Skład

1g maści zawiera:

Substancje czynne:

5mg hydrokortyzony w postaci octanu,

5mg chlorowodoru cynchokainy,

10mg siarczanu neomycyny,

10mg eskuliny w postaci półtorawodzianu.

Substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, parafina ciekła, wazelina kosmetyczna.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Proktosedon jeśli:

- pacjent uczulony jest na składniki leku,
- u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze i wirusowe lub zakrzepicę żylną.

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Moliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Proktosedon może powodować działania niepożądane.

Sporadycznie może pojawić się pieczenie odbytu, zwłaszcza w przypadku znacznego uszkodzenia naskórka. W przypadku długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy niepożądane spowodowane ogólnoustrojowym działaniem hydrokortyzonu.

Uwagi

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30 st. C.

Preparatu Proktosedon nie należy stosować w okresie karmienia piersią ze względu na niebezpieczeństwo hamowania wzrostu przez hydrokortyzon.

Istnieją niepotwierdzone dane wskazujące na ryzyko powstawania rozszczepu podniebienia, wewnątrzmacicznego opóźnienia rozwoju płodów pod wpływem hydrokortyzonu oraz supresyjnego wpływu na oś podwzgórze - przysadka - nadnercza w organizmach płodów pod wpływem hydrokortyzonu stosowanego u kobiet w ciąży. Dlatego preparat Proktosedon u kobiet w ciąży może być zastosowany tylko jeśli istnieje bezwzględna konieczność zastosowania tego leku, po dokładnej ocenie przez lekarza ryzyka i korzyści.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.