

# Propranolol WZF 40 mg 50 tabletek

Nasza cena: 2,88 zł

## Opis słownikowy

Dawka	40MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PROPRANOLOLUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Zaleca się stosowanie leku u pacjentów u których:

- występuje nadciśnienie tętnicze,
- leczenie dławicy piersiowej - poza postacią naczynioskurczową (Primzmetalą),
- profilaktyka wtórna i pierwotna zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową,
- kontrola nadkomorowych i komorowych typów zaburzeń rytmu serca,
- profilaktyka migreny,
- leczenie drżenia samoistnego,
- zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego,
- profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- leczenie wspomagające w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego,
- leczenie kardiomiopatii przerostowej,
- postępowanie okołoperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy.

## Dawkowanie:

Najczęściej podaje się lek w poniższych dolegliwościach.

### Nadciśnieniu tętniczym:

- dawka początkowa wynosi 80 mg 2 razy na dobę i może być zwiększana w odstępach tygodniowych

### Leczenie dławicy piersiowej:

- dawka początkowa wynosi 40 mg 2-3 razy na dobę i może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych

### Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego:

- ostry lęk sytuacyjny: 40 mg na dobę

Ilość leku jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

## Działanie:

Propranolol jest kompetycyjnym antagonistą receptorów adrenergicznych  $\beta_1$  i  $\beta_2$ . Pozbawiony jest właściwości agonistycznych w stosunku do receptorów  $\beta$ , stabilizuje natomiast błony komórkowe w stężeniu od 1-3 mg/l, ale stężenie takie jest rzadko uzyskiwane podczas stosowania preparatu doustnie. Kompetycyjny antagonizm wobec receptorów  $\beta$  został wykazany u ludzi poprzez równoległe przesunięcie w prawo krzywej zależności dawka-częstość rytmu serca dla agonisty receptora  $\beta$ , takiego jak izoprenalina. Propranolol, podobnie jak inne  $\beta$ -adrenolityki, wykazuje działanie inotropowo ujemne i dlatego jest przeciwwskazany w przypadku niewyrównanej niewydolności serca.

## Skład:

1 tabletkę zawiera 40 mg propranololu chlorowodoru.

## Przeciwwskazania:

### Nie zaleca się stosowania leku jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z poniższych dolegliwości:

- astma oskrzelowa i stany skurczowe oskrzeli,
- stwierdzona nadwrażliwość na propranolol lub inne składniki preparatu,
- bradykardia,
- wstrząs kardiogeny,
- niekontrolowana niewydolność serca,
- niedociśnienie tętnicze,
- kwasica metaboliczna,
- długotrwałe głodzenie,
- ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego,
- blok serca stopnia II lub III,
- dławica Prinzmetal,

- zespół chorego węzła zatokowego,
- nieleczony guz chromochłonny.

## **Działania niepożądane:**

### **Najczęstsze działania niepożądane jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku to:**

- zaburzenia snu,
- koszmary nocne,
- bradykardia,
- ziębnięcie i sinienie kończyn,
- choroba Raynauda,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- uczucie zmęczenia (przemijające).

W celu zapoznania się z szerszymi działaniami niepożądanymi należy zasięgnąć informacji w ulotce informacyjnej, u lekarza prowadzącego lub też farmaceuty.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.