

Prospan, syrop, 35mg/ 5ml, 200 ml



Nasza cena: 32,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	200ml
Postać	SYROP
Producent	ENGELHARD GMBH & CO KG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEDERA HELIX

Opis produktu

Opis

W skład leku Prospan wchodzi suchy ekstrakt z liści bluszczu. Głównymi składnikami czynnymi suchego wyciągu z liści bluszczu są saponiny triterpenowe o charakterze glikozydowym. Syrop stosuje się w nieżytach dróg oddechowych w celu zmniejszenia dolegliwości towarzyszącym ostrym i przewlekłym stanom zapalnym dróg oddechowych, przebiegającym z kaszlem. Preparat wykazuje działanie sekretolityczne, spazmolityczne i łagodzące kaszel. Dzięki tym właściwościom zalegający w drogach oddechowych śluz oskrzelowy ulega upłynnieniu, a jego odkasztenie jest ułatwione.

Dawkowanie - Prospan, syrop, 35mg/ 5ml, 200 ml

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: przyjmują po 5 ml syropu 3 razy dziennie. Jeżeli jest to konieczne, dawka dla dorosłych może być zwiększona do 7,5 ml syropu 3 razy dziennie.

Dzieci w wieku 6-9 lat: przyjmują 5 ml syropu 3 razy dziennie.

Dzieci w wieku 1-5 lat: przyjmują 2,5 ml syropu 3 razy dziennie.

U dzieci poniżej 1 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Składniki - Prospan, syrop, 35mg/ 5ml, 200 ml

(200 ml): standaryzowany suchy wyciąg z liści bluszczu (*Hederae helix folii extractum siccum* 5:1)

Ekstrahent - etanol 30% (m/m)

Substancje pomocnicze: sorbitol płynny krystalizujący, sorbitan potasu, kwas cytrynowy bezwodny, guma ksantanowa, aromat wiśniowy, woda oczyszczona.

Lek nie zawiera cukru.

Wskazania - Prospan, syrop, 35mg/ 5ml, 200 ml

Prospan zalecany jest, jako preparat pomocniczy, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, gdyż rozrzedza wydzielinę w oskrzelach i ułatwia oddychanie.

Przeciwwskazania - Prospan, syrop, 35mg/ 5ml, 200 ml

Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na składniki leku.

Przeciwwskazania - Prospan, syrop, 35mg/ 5ml, 200 ml

Bardzo po przyjęciu leków zawierających wyciąg z bluszczu mogą wystąpić reakcje alergiczne, jak np.: duszność, obrzęk, zaczerwienienie, swędzenie skóry.

U osób wrażliwych niezbyt często mogą pojawić się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego jak np. nudności, wymioty, biegunka oraz działanie przeczyszczające związane z zawartością sorbitolu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.