

Prostamnic 0,4 mg 30 kapsułek

Nasza cena: 8,03 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,4 MG
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	PLUS PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TAMSULOSINUM

Opis produktu

Opis

Prostamnic 0,4 mg 30 kapsułek

Wskazania:

Produkt jest zalecany do stosowania przez pacjentów u których wykryto zmiany związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Dawkowanie:

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. To on ustala dawkę jaką powinien przyjmować pacjent. Nie należy zmieniać i modyfikować zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Działanie:

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetycyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi typu α_1 , szczególnie z podtypami α_{1A} oraz α_{1D} . Powoduje to rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Skład:

1 kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu jeżeli u któregokolwiek z pacjentów występują poniższe dolegliwości:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi
- ciężka niewydolność wątroby.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Działania te nie u wszystkich pacjentów muszą się objawiać i przebiegać w taki sam sposób. Jeżeli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych dolegliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- zawroty głowy,
- niewyraźne widzenie,
- zaburzenia widzenia,
- zaparcia,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- nieprawidłowy wytrysk,
- wytrysk wsteczny,
- brak wytrysku.

W celu poznania innych działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.