

Protevasc SR 35 mg 60 tabletek

Nasza cena: 17,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	35MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	POLFA GRODZISK MAZOWIECKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRIMETAZIDINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest zalecany do stosowania w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe 1-szego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Dawkowanie:

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

- zazwyczaj zaleca się stosowanie 1 tabletki 35 mg 2 razy na dobę,
- należy stosować 1 tabletkę rano i 1 wieczorem najlepiej podczas posiłków.

Działanie:

- optymalizuje procesy energetyczne w komórkach,
- utrzymanie prawidłowy metabolizm podczas niedokrwienia.

Skład:

1 tabletkę zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodoru.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- nadwrażliwość na produkty zawierające soję lub orzeszki ziemne,
- choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg,
- ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane jakie występują najczęściej podczas stosowania leku to:

- zawroty głowy,
- ból głowy;
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- ból brzucha,
- niestrawność,
- wysypka,
- świąd,
- pokrzywka,
- astenia.

Po więcej informacji należy sięgnąć do ulotki informacyjnej dołączonej do opakowania leku bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zauważyć, iż działania niepożądane mogą pojawiać się jedynie u części pacjentów. U niektórych z pacjentów mogą one w ogóle nie występować.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.