

PROURSAN 500 MG *50

Nasza cena: 118,54 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 MG
Opakowanie	*50
Postać	TABL.POWL.
Producent	Pro.med.cs Praha A.s. Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

Opis produktu

Opis

Wskazania do stosowania:

- Pierwotne zapalenie dróg żółciowych u pacjentów bez zdekompensowanej marskości wątroby
- Leczenie chorób wątroby o różnej etiologii w przypadku braku wskazań do innych rekomendowanych terapii.
- Zapalenie błony śluzowej żołądka spowodowane zarzucaniem żółci.
- Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana.

Dzieci i młodzież:

Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Dawkowanie i sposób podawania:

Lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i pod ścisłą kontrolą. Sposób przyjmowania leku jest różny w zależności od dolegliwości które dotknęły pacjenta. Wszelkie niezbędne informacje zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku.

Przeciwwskazania:

Produktu leczniczego Proursan nie należy stosować u pacjentów z:

- ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

- niedrożnością dróg żółciowych (niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego)
 - częstymi epizodami kolki żółciowej
 - zwapniałymi kamieniami żółciowymi widocznymi w promieniach rentgenowskich
 - osłabioną kurczliwość pęcherzyka żółciowego
-
- nadwrażliwością na kwasy żółciowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 - po nieudanym zabiegu portoenterostomii lub braku uzyskania poprawy w przepływie żółci dzieci z niedrożnością dróg żółciowych.

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit:

W badaniach klinicznych często zgłaszano występowanie jasnych stolców lub biegunki podczas przyjmowania kwasu ursodeoksycholowego.

Bardzo rzadko podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej wątroby występował silny ból w prawym górnym kwadrancie brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W trakcie leczenia kwasem ursodeoksycholowym w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do zwapnienia kamieni żółciowych.

W trakcie leczenia ciężkiej pierwotnej marskości żółciowej wątroby obserwowano bardzo rzadko przypadki nasilenia objawów marskości wątroby, które częściowo ustępowały po odstawieniu leku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko może wystąpić pokrzywka.

Jeżeli pacjent ma jakiegokolwiek wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym bądź też zasięgnąć porady u farmaceuty. Wszelkie niezbędne informacje zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.