

Pulmoterol 50 µg 60 kapsułek

Nasza cena: 7,40 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MCG
Opakowanie	*60
Postać	KAPS.
Producent	LEK-AM ZAKROCZYN P.F. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	SALMETEROLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Lek jest wskazany do regularnego, długotrwałego objawowego leczenia odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Produkt leczniczy jest wskazany szczególnie u pacjentów z dusznościami nocnymi i/lub objawami występującymi w ciągu dnia, związanymi z odwracalną obturacją oskrzeli (np. duszność powysiłkowa, trudny do uniknięcia kontakt z alergenami).

Dawkowanie:

Astma oskrzelowa. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: inhalacja zawartości 1 kaps. (1 x 50 µg salmeterolu) 2x/dobę. U pacjentów z astmą, u których stwierdzono ciężką obturację dróg oddechowych, można zalecić zwiększenie dawki do inhalacji zawartości 2 kaps. (2 x 50 µg salmeterolu) 2x/dobę. Dzieci powyżej 4 lat: inhalacja zawartości 1 kaps. (1 x 50 µg salmeterolu) 2x/dobę. Nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 4 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. POChP. Dorośli: inhalacja zawartości 1 kaps. (1 x 50 µg salmeterolu) 2x/dobę

Skład:

1 kapsułka twarda (co odpowiada jednej dawce inhalacyjnej) zawiera 50 µg salmeterolu w postaci 72,5 µg salmeterolu ksynafricanu.

Przeciwwskazania:

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na salmeterolu ksynafrican lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Częstość występowania działań niepożądanych podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych po wprowadzeniu salmeterolu do obrotu. Podane częstości występowania objawów dotyczą dawki standardowej 50 µg 2x/dobę. Częstość występowania objawów po podaniu większych dawek, 100 µg 2x/dobę, brano pod uwagę w odpowiednich miejscach. Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje objawiające się): (niezbyt często) wysypką; (bardzo rzadko) reakcjami anafilaktycznymi, w tym obrzęk i obrzęk naczyńioruchowy, skurcz oskrzeli i wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (rzadko) hipokaliemia; (bardzo rzadko) hiperglikemia. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) nerwowość; (rzadko) bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego: (często) bóle głowy; (często) drżenia; (rzadko) zawroty głowy. Zaburzenia serca: (często) kołatanie serca; (niezbyt często) tachykardia; (bardzo rzadko) zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy oraz skurcze dodatkowe). Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) podrażnienie jamy ustnej i gardła, paradoksalny skurcz oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) nudności.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.