

# Pyralgina, 50 tabletek

Nasza cena: 43,57 zł



## Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	METAMIZOLUM

## Opis produktu

### Opis

## Pyralgina, 50 tabletek

### Wskazania:

Leczenie bólu o różnym pochodzeniu, o dużym nasileniu oraz gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

### Dawkowanie:

Lek Pyralgina 500mg należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Dawka zależy od nasilenia bólu lub gorączki oraz reakcji danej osoby na lek Pyralgina. Należy zawsze wybierać najmniejszą dawkę konieczną do opanowania bólu i (lub) gorączki.

Dorosli i młodzież od 15. roku życia (o masie ciała wyższej niż 53kg): maksymalnie jednorazowo podawać można 1000mg metamizolu (2 tabletki), do 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6–8 godzin. Maksymalna dawka dobową to 4000mg (co odpowiada 8 tabletkom).

Lek Pyralgina nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Dla młodszych dzieci dostępne są inne postacie i moce tego leku. Należy zapytać o to lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

### Sposób użycia:

Tabletki należy połknąć, popijając dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody). Lek należy stosować w trakcie posiłku lub bezpośrednio nim. Wyraźnego działania można spodziewać się po upływie od 30 do 60 minut od podania doustnego.

Leku nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez porozumienia z lekarzem lub niezwłocznie udać się do lekarza, gdy pomimo stosowania leku,

objawy nasilają się.

### Składniki:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: metamizol sodowy jednowodny 500mg; substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**