

## Pyralgina 500 mg, 6 tabletek



Nasza cena: 7,85 zł

### Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*6
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	METAMIZOLUM

### Opis produktu

#### Opis

### Pyralgina 500 mg, 6 tabletek

Pyralgina (metamizolum natrium) jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy pochodnych pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym (silniejszym od salicylanów) i przeciwzapalnym. Działa również słabo rozkurczowo na mięśnie gładkie, uspokajająco i przeciwwysiękowo.

#### Dawkowanie

Zależne od nasilenia bólu. Zwykle stosuje się u dorosłych:  
- w bólach występujących sporadycznie - jednorazowo od 1 do 2 tabletek.  
- w bólach przewlekłych – od 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.

Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g, maksymalna dawka dobową 3 g.

#### Skład

(1 tabletki): Metamizolum natrium 500 mg  
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

#### Działanie

Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności enzymu - cyklooksygenazy w ośrodkowym układzie nerwowym.

#### Wskazania

Lek Pyralgina wskazany jest w leczeniu: bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu, a także gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

## Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu; uczulenie na inne NLPZ; astma; zmiany skórne w obrazie morfologicznym krwi; ostra niewydolność nerek, wątroby, ostra porfiria wątrobowa; niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

## Możliwe działania nieporządane

Ciężkie reakcje uczuleniowe: obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, które mogą powodować utrudnienia oddychania i połykania; zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, ciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. - preparat należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo rzadko: agranulocytoza objawiająca się: wysoką gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy, podwyższonym OB, nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnyymi.

### Inne działania niepożądane:

osutka polekowa, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zmiany skórne grudkowo-plamkowe, leukopenia, u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej napad astmy, zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella, wstrząs, małopłytkowość, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

## Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na metamizol i inne pochodne pirazonu, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, zaburzenia czynności krwiotwórczej szpiku, zmiany w obrazie morfologicznym krwi, astmę (wywołaną lub zaostrzoną przez niesteroidowe leki przeciwzapalne), niskie ciśnienie krwi, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy. Gdy przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, sulfonamidy, fenytoinę, cyklosporynę, barbiturany, inhibitory MAO, chlorpromazynę. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**