

Pyrantelum Medana 250mg/5ml 15 ml



Nasza cena: 18,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15ml
Postać	ZAW.
Producent	MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PYRANTELUM

Opis produktu

Opis

Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml zawiesina 15 ml

Zastosowanie :

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum Medana jest lekiem przeciw pasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Skład:

Substancją czynną leku jest pyrantel 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu). Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70%(E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbata 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci - Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11kg to: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania:

Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana

Przeciwwskazania:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
- Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii(choroba mięśni szkieletowych)

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyrantelum Medana należy omówić to z lekarzem.

Działania niepożądane:

- nudności,
- wymioty,
- zaburzenia łaknienia,
- bóle brzucha,
- biegunka,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
- alergiczne wysypki skórne
- bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.