

Pyrosal, syrop, 125 ml



Nasza cena: 16,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125 g
Postać	SYROP
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Syrop Pyrosal jest preparatem opartym na wyciągu z czterech ziół: kory wierzby, kwiatu bzu czarnego, kwiatostanu lipy oraz liścia podbiału, stosowanym tradycyjnie jako środek pomocniczy w stanach podgorączkowych w przebiegu anginy, grypy, zapalenia gardła i oskrzeli. Ciała czynne z ziół zawarte w syropie działają głównie przeciwgorączkowo, napotnie i przeciwzapalnie.

Dawkowanie - Pyrosal, syrop, 125 ml

- Dzieci od 3 roku do 4 lat po konsultacji z lekarzem - 4 razy na dobę 1 łyżeczka od herbaty (1 łyżeczka - 5 ml syropu). Syrop można rozcieńczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody.
- dzieci od 4 do 12 lat - 3 razy na dobę 1 łyżka stołowa (1 łyżka-15 ml syropu).
- młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli: 3 razy na dobę 2 łyżki stołowe syropu.

Składniki - Pyrosal, syrop, 125 ml

(100 g): wyciąg płynny (1:1) z: liścia podbiału, kwiatu bzu czarnego, kwiatostanu lipy i kory wierzby (25:30:30:15), koncentrat z porzeczki - 5,0 cz., kondensat aromatu soku z porzeczki - 0,5 cz., sacharoza - 60,0 cz., woda oczyszczona - 24,5 cz. Pyrosal pozbawiony jest konserwantów, zawiera wyłącznie dobroczynne i przyjazne zdrowiu Twojego dziecka komponenty.

Syrop zawiera do 1% (m/m) etanolu.

Działania

Przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Wskazania - Pyrosal, syrop, 125 ml

Środek przeciwgorączkowy stosowany pomocniczo w przeziębieniach, działający przeciwzapalnie i napotnie, zwłaszcza w anginie, grypie, zapaleniu gardła i oskrzeli.

Przeciwwskazania - Pyrosal, syrop, 125 ml

Nie należy stosować leku Pyrosal jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Dotychczas w trakcie stosowania Pyrosalu nie odnotowano występowania działań niepożądanych.

U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki preparatu. U osób źle tolerujących wysokie dawki sacharozy mogą wystąpić nudności.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed użyciem leku powinni kontaktować się z lekarzem. 1 łyżka stołowa (15 ml) syropu zawiera ok. 12,7 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Syrop zawiera w jednej łyżeczce do 65 mg etanolu. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Leku nie należy stosować w czasie ciąży. Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.