

Quecor 370 mg, 30 tabletek



Nasza cena: 11,82 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 0,37G |
| Opakowanie | *30 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | LABOFARM STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | QUERCUS |

Opis produktu

Opis

Działanie:

Garbniki zawarte w korze dębu wykazują działanie ściągające, co powoduje hamowanie biegunki.

Wskazania do stosowania:

- Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.
- Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje: czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:
Lek może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego lek ten powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed lub po zastosowaniu innych leków.

Ostrzeżenia specjalne:

Stosowanie leku u dzieci:
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nieznany.

Dawkowanie:

Dorośli: doustnie 2 tabletki 3 razy dziennie.
Nie stosować dłużej niż 3 dni.

Przedawkowanie:

Nie zarejestrowano przypadków przedawkowania.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych oraz działań niepożądanych, niewymienionych w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.