

Radirex Max, 10 kapsułek



Nasza cena: 10,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	KAPS.
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	RHEUM OFFICINALE

Opis produktu

Opis

Radirex Max, 10 kapsułek

Radirex MAX jest roślinnym produktem leczniczym do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach. Maksymalna moc w walce z zaparciami. Działa silnie ale nie gwałtownie. Proste dawkowanie dzięki zastosowaniu maksymalnej, leczniczej dawki substancji czynnej. Nowoczesna forma łatwej do połknięcia kapsułki.

Wskazania:

Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.

Sposób użycia:

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

2 kapsułki Radirex MAX na dobę, wieczorem.

Pacjenci, u których działanie jest zbyt silne, mogą obniżyć dawkę i stosować 1 kapsułkę na dobę, wieczorem.

Najodpowiedniejszą dawką jednorazową jest najniższa dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.

Działanie przeczyszczające następuje po 8 – 12 godzinach.

Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.

Maksymalną dawką dobową jest 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych. Odpowiada to dwóm kapsułkom Radirex MAX.

Skład:

1 kapsułka zawiera:

Substancja czynna: 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z korzenia rzewienia (*Rheum palmatum L.* i/lub *Rheum officinale Baillon*), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), ból brzucha z nieznaną przyczyną, ciężkie odwodnienie z nadmierną utratą elektrolitów i wody.

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.