

## Ranigast Max, tabletki powlekane, 10 szt.

Nasza cena: 7,72 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	Polpharma S.a. Starogard Gdański
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany w objawowym leczeniu dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

#### Dawkowanie - Ranigast Max, tabletki powlekane, 10 szt.

W przypadku wystąpienia objawów niestrawności należy zastosować 1 tabletkę powlekaną 150 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody. Leku nie należy stosować samodzielnie przez dłużej niż 2 tygodnie.

#### Składniki - Ranigast Max, tabletki powlekane, 10 szt.

(1 tabletkę): ranitydyna 150 mg, substancje pomocnicze: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokryształiczna, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza, lak z żółcieni pomarańczowej, tytanu dwutlenek, triacetyna, talk

#### Działania

Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

#### Wskazania - Ranigast Max, tabletki powlekane, 10 szt.

Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Lek działa szybko. Czas działania 1 tabletki wynosi około 12 godzin.

#### Przeciwwskazania - Ranigast Max, tabletki powlekane, 10 szt.

- gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub na inny składnik leku,
- dzieci w wieku poniżej 16 lat.

#### Przeciwwskazania - Ranigast Max, tabletki powlekane, 10 szt.

Bardzo rzadko: bóle głowy i zawroty, przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych, przemijające stany splątania, depresja i omamy, blok przedsionkowo-komorowy, zapalenie naczyń, zapalenie wątroby, ostre zapalenie trzustki, biegunka, bóle stawowe i mięśniowe, leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, ginekomastia, przemijająca impotencja, rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów, wstrząs anafilaktyczny,

Rzadko: pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, zwiększenie liczby eozynofili, niedociśnienie, ból w klatce piersiowej.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**