

Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane, 10 szt.



Nasza cena: 5,71 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	Polpharma S.a. Starogard Gdański
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w objawowym leczeniu dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Dawkowanie - Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat - w przypadku wystąpienia objawów niestrawności należy zastosować 1 tabletkę powlekaną 75 mg. Jeśli po przyjęciu preparatu dolegliwości utrzymują się dłużej niż 1 godzinę lub nawracają, można przyjąć następną tabletkę 75 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Składniki - Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

Substancją czynną zawartą w leku Ranigast PRO jest 75 mg ranitydyny w postaci chlorowodoru (co odpowiada 84 mg chlorowodoru ranitydyny).

Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.

otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcią pomarańczową E 110, tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.

Działania

Ranitydyna, substancja czynna leku Ranigast PRO, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Wskazania - Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Lek usuwa w krótkim czasie zgagę i niestrawność. 1 tabletkę działa około 6-8 godzin.

Przeciwwskazania - Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

Leku Ranigast PRO nie należy stosować w przypadku, gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub

na inny składnik leku, u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przeciwwskazania - Ranigast Pro, 75 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania:

często: występujące u przynajmniej 1% pacjentów,
niezbyt często: występujące u 0,1% do 1% pacjentów,
rzadko: występujące u 0,01% do 0,1% pacjentów
bardzo rzadko: występujące u mniej niż u 0,01% pacjentów.

U pacjentów stosujących ranitydynę obserwowano następujące działania niepożądane:

bardzo rzadko: bóle głowy i zawroty głowy, przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych, przemijające stany splątania, depresja, omamy, zwolnienie akcji serca, blok przedsionkowo-komorowy, zapalenie naczyń, zwykle przemijające zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez, ostre zapalenie trzustki, biegunka, bóle stawowe i mięśniowe, zwykle przemijająca leukopenia i trombocytopenia, agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z aplazją lub hipoplazją szpiku, ginekomastia, przemijająca impotencja, rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów, wstrząs anafilaktyczny, niewyraźne widzenie.

rzadko: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, zwiększenie liczby eozynofili, niedociśnienie, ból w klatce piersiowej.

Uwagi

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza w następujących przypadkach:

- przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
- zaburzeń czynności wątroby lub nerek,
- porfirii,
- gdy wraz z niestrawnością występuje utrata masy ciała,
- stosowania NLPZ,
- współistniejących chorób, leczonych innymi lekami przepisanyymi przez lekarza.

Leczenie ranitydyną może maskować objawy nowotworu.

Ciąża i karmienie piersią: przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn w czasie stosowania ranitydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano działania niepożądane, takie jak: zawroty i bóle głowy lub niewyraźne widzenie, które mogą ograniczyć sprawność psychofizyczną.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.