

Ranimax, 150 mg, 10 tabletek



Nasza cena: 5,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	150MG
Opakowanie	*10
Postać	TABL.POWL.
Producent	Pliva Kraków Z.f. S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego takich jak: zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu.

Dawkowanie - Ranimax, 150 mg, 10 tabletek

Dorośli i młodzież od lat 12: w przypadku występowania objawów dyspeptycznych należy zastosować 1 tabletkę, w razie potrzeby 2 raz na dobę. Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki preparatu na dobę. Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 2 tygodnie.

Składniki - Ranimax, 150 mg, 10 tabletek

1 tabletkę zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokryształiczna, powidon, magnezu stearynian, hypromeloza, tytan dwutlenek, makrogol 6000, laktoza jednowodna.

Działania

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Powoduje ustąpienie w krótkim czasie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu.

Przeciwwskazania - Ranimax, 150 mg, 10 tabletek

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- marskość wątroby,
- dzieci w wieku do 12 lat.

Przeciwwskazania - Ranimax, 150 mg, 10 tabletek

Obserwowano: nudności, wymioty, biegunki, zaparcia. Mogą wystąpić przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych oraz

pojedyncze przypadki przemijającego zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez. Rzadko występowało ostre zapalenie trzustki. Rzadko może wystąpić przemijająca trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza oraz pancytopenia (czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku). Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, gorączka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs anafilaktyczny) występują bardzo rzadko. Bardzo rzadko występowały przypadki bradykardii i ciężkich arytmii oraz niedociśnienia. U pacjentów obserwowano ból i zawroty głowy. Rzadko występowały przemijające stany splątania, depresji, omamów (głównie u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku), przemijające ruchy mimowolne. Donoszono o występowaniu wysypki skórnej, w tym rzadkich przypadków rumienia wielopostaciowego. Rzadko zapalenie naczyń i łysienie oraz objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego w postaci bólów stawów i mięśni. Rzadko dochodziło do przemijających zaburzeń widzenia, wskazujących na zaburzenia akomodacji. Rzadko przemijająca impotencja. Zanotowano kilka przypadków ginekomastii u mężczyzn.

Uwagi

Przed zastosowaniem leku w ciąży i okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.