


Raphacholin forte, 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 37,42 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,25G
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	HERBAPOL-WROCŁAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM DEHYDROCHOLICUM

Opis produktu

Opis

Raphacholin forte, 30 tabletek powlekanych

Raphacholin forte wskazany jest do stosowania przy niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności, której towarzyszą takie objawy jak: **wzdęcia, bóle brzucha, odbijanie, nudności czy zaparcia**. Może być również stosowany jako łagodny środek przeczyszczający. W takim przypadku lek pomaga w łagodny sposób, bez ryzyka przyzwyczajenia organizmu.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera

Substancja czynna: Kwas dehydrocholowy - 250 mg

Substancje pomocnicze: wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1) [wyciąg natywny (20-30:1) 50 %, maltodekstryną 50 %, ekstrahent - woda] olejki eteryczne miętowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, węgiel aktywny, powłóczka Aqua Polish black 081.06 o składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol, tlenek żelaza czarny (E 172), indygotyna (E 132).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem bądź farmaceutą. Lek należy stosować doustnie.

W przypadku niestrawności:

- dorośli 1 tabletkę po posiłku, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 3 tabletek na dobę.

W przypadku zaparcia:

- dorośli 2 tabletki jednorazowo. Efekt przeczyszczający spodziewany jest do 6 godzin.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.