

# Reagila 1,5 mg, 28 kapsułek twardych

Nasza cena: 236,22 zł

## Opis słownikowy

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Dawka             | 1,5 MG                         |
| Opakowanie        | *28                            |
| Postać            | KAPS.TWARDE                    |
| Producent         | GEDEON RICHTER LTD. WĘGRY [HU] |
| Rejestracja       | Lek na receptę                 |
| Substancja czynna | CARIPRAZINUM                   |

## Opis produktu

### Opis

## Wskazania do stosowania Reagila

Reagila zawiera substancję czynną kariprazynę, należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi stosowanych w leczeniu osób dorosłych chorych na schizofrenię.

## Skład

Substancją czynną leku Reagila jest kariprazyna.

Pozostałe składniki to:

prezelowana skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), zelatyna, czarny tusz (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy, potasu wodorotlenek).

## Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów uczulonych na kariprazynę lub pozostałe składniki leku.

## Interakcje z innymi lekami

Nie stosować jeśli stosuje się:

- leki zawierające boceprewir i telaprewir;
- leki zawierające klarytromycynę, telitromycynę, erytromycynę i nafcylinę)
- leki zawierające ryfampicynę
- leki zawierające kobicystat, indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir, efawirenz i etrawiryne

- leki zawierające itrakonazol, pozakonazol, worykonazol i flukonazol
- leki zawierające ketokonazol
- leki ziotowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (*Hypericum perforatum*)
- leki zawierające nefazodon
- leki zawierające karbamazepinę, fenobarbital i fenytoinę
- leki zawierające diltiazem i werapamil
- leki zawierające modafinil
- leki zawierające bosentan

## Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ten lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzie w wieku poniżej 18 lat.

## Stosowanie leku Reagila z jedzeniem, pićm i alkoholem

Podczas stosowania leku Reagila nie należy s[pożywać soku grejpfrutowego oraz unbiakać alkoholu.

## Ciąża, karmienie , wpływ na płodność

Nie należy stosować leku podczas ciąży

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia tym lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność. Lek może wywołać senność, zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

## Dawkowanie

Lek stostuje się zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg raz na dobę, doustnie. Lekarz może stopniowo dostosowywać dawki, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 6 mg raz na dobę

Lek Reagila należy o tej samej porze.

## Działania niepożądane / skutki uboczne

Należy skontaktować się z lekażemy jeśli wystąpi

- ciężka reakcja alergiczna
- gorączka, pocenie się, sztywność mięśni

### Częste skutki uboczne:

- senność, trudność w zasypianiu, nietypowe sny, koszmary, lunatykowanie, zawroty głowy
- zgrzytanie zębami, szcękoscisk, ślink\otok, zaburzenia ruchowe,
- niewyraźne widzenie
- wysokie ciśnienie krwi
- szybkie, nieregularne bicie serca
- zmniejszony lub zwiększony apetyt
- nudności, wymioty, zaparcia
- zwiększenie masy ciała

## Niezbyt częste działania niepożądane

- depresja
- nagłe i poważne splątanie
- uczucie wirowania
- nieprzyjemny, nieprawidłowy zmysł dotyku
- senność, brak energii lub brak zainteresowania wykonywanymi pracami
- ruchy mimowolne, najczęściej języka lub twarzy.
- zmniejszenie lub zwiększenie pożądania seksualnego, problemy z erekcją
- podrażnienie oczu, wysokie ciśnienie w oku, słabe widzenie
- zaburzenia związane z akomodacją
- niskie ciśnienie krwi
- nieprawidłowy zapis EKG, nieprawidłowe impulsy nerwowe w sercu
- powolne, nieregularne tętno
- czkawka
- zgaga
- pragnienie
- ból podczas oddawania moczu
- częstomocz
- swędzenie, wysypka cukrzyca

## Rzadkie działania niepożądane

- napad drgawkowy
- utrata pamięci, utrata mowy
- dyskomfort oczu przy jasnym świetle
- zmętnienie soczewki w oku prowadzące do zaburzeń widzenia (zaćma)
- trudności w połykaniu
- zmniejszony poziom białych krwinek
- niedoczynność tarczycy

## Przechowywanie leku

Lek przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Podmiot odpowiedzialny i wytworca

Gedeon Richter Plc.  
Gyomroi ut 19-21  
1103 Budapeszt

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.