

Remifemin, tabletki, 60 szt. (import równoległy)



Nasza cena: 29,00 zł

Opis słownikowy

Producent	Inpharm Sp. Z O. O.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Remifemin wytwarzany jest w postaci tabletek, które zawierają w swoim składzie wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej.

Dawkowanie:

Remifemin tabletki stosuje się 2 razy dziennie (rano i wieczorem) po 1 tabletkę, popijając niewielką ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać ani ssać. Terapeutyczne efekty działania Remifemin tabletki pojawiają się po dwóch tygodniach stosowania. Stosowanie preparatu dłużej niż 6 miesięcy wymaga konsultacji z lekarzem.

Składniki:

1 tabletkę zawiera: Cimicifugae racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78- 1,14:1) izopropanolicum 40% (V/V) 0,018-1,026 ml (co odpowiada 20 mg kłącza pluskwicy groniastej). Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, olejek miętowy do 280 mg.

Działania:

Remifemin zmniejsza nasilenie objawów klinicznych towarzyszących niedoborowi estrogenów u kobiet w okresie przekwitania oraz dolegliwości towarzyszące bolesnym krwawieniom miesięczkowym.

Wskazania:

Remifemin tabletki stosuje się jako środek łagodzący dolegliwości okresu przekwitania: przebiegi uczucia gorąca, nadmierne pocenie się, zaburzenia snu, uczucie wzmożonego napięcia nerwowego i niepokoju.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Remifemin w przypadku znanej nadwrażliwości (alergii) na substancję czynną lub na inny składnik preparatu.

Rzadko występują dolegliwości żołądkowe (niestrawność, biegunka), skórne reakcje uczuleniowe (wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry), obrzęk twarzy i obrzęk kończyn. Rzadko może pojawić się wzrost enzymów wątrobowych (transaminaz). Istnieją doniesienia na temat uszkodzenia wątroby związanego ze stosowaniem produktów leczniczych uzyskiwanych z kłącza pluskwicy groniastej.

Uwagi:

Jeżeli podczas stosowania występują: uczucie wzmożonego napięcia i bolesnego nabrzmienia piersi (mastodynia) lub zaburzenia krwawienia miesięczkowego należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.