

Rennie Fruit, tabletki, 24 szt.

Nasza cena: 16,42 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*24
Postać	TABL.D/SSANIA
Producent	BAYER POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CALCIUM CARBONICUM, MAGNESIUM

Opis produktu

Opis

Preparat do stosowania w objawowym leczeniu dolegliwości związanych z nadkwaśnością.

Substancją czynną preparatu jest węglan wapnia i węglan magnezu. Substancje te reagują z kwasem solnym zawartym w soku żołądkowym czego skutkiem jest zobojętnienie odczynu soku żołądkowego (zwiększa się pH soku żołądkowego). Ogranicza to uszkodzający wpływ soku żołądkowego na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy.

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego (zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności, odbijanie).

Dawkowanie - Rennie Fruit, tabletki, 24 szt.

Preparat ma postać tabletek do ssania. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy ssać/żuć lub rozgryźć. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 1–2 tabletek 1 godzinę po posiłku i przed snem, w razie potrzeby można przyjąć dodatkowo 1–2 tabletek pomiędzy zwykłymi porami dawkowania; maksymalna 16 tabletek na dobę.

Składniki - Rennie Fruit, tabletki, 24 szt.

1 tabletki zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg węglanu magnezu oraz substancje pomocnicze.

Działania

Rennie Fruit zawiera dwie substancje o działaniu miejscowo zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Wskazania - Rennie Fruit, tabletki, 24 szt.

Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, tj:

- zgaga
- niestrawność
- wzdęcia
- nudności
- uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu
- odbijanie

Przeciwwskazania - Rennie Fruit, tabletki, 24 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; niewydolność nerek, zwiększone stężenie wapnia we krwi, kamica nerkowa.

Przeciwwskazania - Rennie Fruit, tabletki, 24 szt.

Jak każdy lek, również Rennie Fruit może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować wystąpienie: zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększonego stężenia magnezu we krwi (hipermagnezemia), zasadowicy, szczególnie u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Niekiedy związki magnezu mogą mieć działanie przeczyszczające (zwłaszcza przyjmowane w dużych dawkach). Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.