

## Reparil, 20 mg, drażetki, 40 szt



Nasza cena: 30,32 zł

### Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*40
Postać	DRAZ.
Producent	DR MADAUS NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCINUM

### Opis produktu

#### Opis

Reparil stosowany jest w obrzękach po miejscowych urazach.

#### Dawkowanie - Reparil, 20 mg, drażetki, 40 szt

Lek Reparil należy stosować zgodnie z zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek należy przyjmować w następujący sposób:

- dorośli młodzież od 14 lat - 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawkę podtrzymującą 1 tabletkę 3 razy na dobę;
- dzieci od 7 do 14 lat - zaleca się podawanie 1 tabletki 2 do 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

#### Składniki - Reparil, 20 mg, drażetki, 40 szt

Substancja czynna: 20 mg beta - Escyna (Escinum)

Substancje pomocnicze: laktroza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudagrit L 100-55), Makrogl 8000, sodu wodorotlenek, karmelozja sodowa, trietylu cytrynian, silikon emulsja, wosk pszczeli, wosk Carnauba.

#### Przeciwwskazania - Reparil, 20 mg, drażetki, 40 szt

- nadwrażliwość na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
- niewydolność lub zaburzenia nerek;

- ciąża i okres karmienia piersią.

### Przeciwwskazania - Reparil, 20 mg, drażetki, 40 szt

Zaburzenia układu immunologicznego  
bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka.

Zaburzenia żołądka i jelit  
niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

### Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie należy stosować tego leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**