

Reparil tabletki dojelitowe 20mg x 40 (import równoległy)



Nasza cena: 16,47 zł

Opis słownikowy

Dawka	20 MG
Opakowanie	*40
Postać	TABL.DOJELITOWE
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCINUM

Opis produktu

Opis

Reparil stosowany jest w obrzękach po miejscowych urazach.

Dawkowanie:

Lek Reparil należy stosować zgodnie z zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek należy przyjmować w następujący sposób:

- dorośli młodzież od 14 lat - 2 tabletki 3 razy na dobę, w lekkich przypadkach i jako dawkę podtrzymującą 1 tabletkę 3 razy na dobę;
- dzieci od 7 do 14 lat - zaleca się podawanie 1 tabletki 2 do 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

Składniki:

Substancja czynna: 20 mg beta - Escyna (Escinum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudagrit L 100-55), Makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, silikon emulsja, wosk pszczeli, wosk Carnauba.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
- niewydolność lub zaburzenia nerek;
- ciąża i okres karmienia piersią.

Przeciwwskazania:

Zaburzenia układu immunologicznego
bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka.

Zaburzenia żołądka i jelit
niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

Uwagi:

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie należy stosować tego leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.