

Ridlip 5 mg 28 tabletek

Nasza cena: 2,40 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	RANBAXY POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ROSUVASTATINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- pierwotna hipercholesterolemia
- rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia
- zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Dawkowanie:

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz badań

Leczenie hipercholesterolemii:

- zalecana dawka początkowa wynosi od 5 do 10 mg, doustnie, raz na dobę,
- jeżeli istnieje taka konieczność po upływie 4 tygodni leczenia dawkę można zwiększyć.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym:

- zaleca się stosować dawkę 20 mg na dobę.

Działanie:

Produkt Ridlip wykazuje działanie zmniejszające stężenie cholesterolu.

Skład:

1 tabletkę zawiera 5,198 mg soli wapniowej rozuwastatyny, co odpowiada 5 mg rozuwastatyny.

Przeciwwskazania:

- u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u pacjentów z czynną chorobą wątroby,
- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
- u pacjentów z miopatią,
- u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną,
- u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży,
- niedoczynność tarczycy,
- genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny,
- wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni,
- nadużywanie alkoholu,
- sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu w osoczu,
- pochodzenie z Azji,
- jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne i przemijające. Pojawiają się one jedynie u części pacjentów, u niektórych z nich mogą w ogóle nie występować.

Działania niepożądane objawiają się najczęściej jako:

- cukrzyca,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- zaparcia, nudności,
- bóle brzucha,
- bóle mięśni,
- astenia.

W celu zaznajomienia się z innymi działaniami niepożądanymi należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania leku bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz

informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.