

## Rivel, żel odkażający i przyspieszający gojenie, 30 g



Nasza cena: 27,13 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,5%
Opakowanie	30 g
Postać	ZEL
Producent	Pharmaswiss Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ETHACRIDINI LACTAS

### Opis produktu

#### Opis

Rivel jest żelem do stosowania miejscowego. W skład leku wchodzi substancja czynna - mleczan etakrydyny.

#### Dawkowanie - Rivel, żel odkażający i przyspieszający gojenie, 30 g

Należy cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe w ilości zależnej od rodzaju i powierzchni schorzenia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Stosować 2-3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Żel można stosować również pod opatrunki.

#### Składniki - Rivel, żel odkażający i przyspieszający gojenie, 30 g

1 g żelu zawiera 5 mg substancji czynnej - mleczanu etakrydyny oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

#### Działania

Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje działanie przeciwbakteryjne, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe i stan zapalny.

#### Wskazania - Rivel, żel odkażający i przyspieszający gojenie, 30 g

Lek Rivel stosuje się zewnętrznie:

- do odkażania skóry i błon śluzowych;
- do wspomagającego leczenia zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie) mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych)
- po ukąszeniu owadów.

## Przeciwwskazania - Rivel, żel odkażający i przyspieszający gojenie, 30 g

Nie należy stosować leku Rivel w przypadku rozpoznanej nadwrażliwości na mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Przeciwwskazania - Rivel, żel odkażający i przyspieszający gojenie, 30 g

W rzadkich przypadkach może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd), które przemija po odstawieniu leku. U niektórych osób, w czasie stosowania leku Rivel, mogą wystąpić inne objawy niepożądane o charakterze miejscowych odczynów alergicznych.

## Uwagi

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Należy unikać kontaktu z oczami. W razie przedostania się żelu do oczu, należy go usunąć obficie spłukując wodą. Unikać kontaktu leku z odzieżą.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**