

Robitussin Antitussicum syrop na suchy kaszel, 100 ml



Nasza cena: 8,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	SYR.
Producent	Wyeth Lederle Pharma GmbH
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Psychotrop

Opis produktu

Opis

Syrop na suchy kaszel.

Dawkowanie - Robitussin Antitussicum syrop na suchy kaszel, 100 ml

Młodzież od 12 roku życia i dorośli: doustnie 20 ml 3 lub 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobową dekstrometofanu 120 mg). Lek odmierzać za pomocą załączonej 10 ml miarki.

Składniki - Robitussin Antitussicum syrop na suchy kaszel, 100 ml

Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometofanu;
substancje pomocnicze: gliceryna, karboksymetyloceluloza sodowa, benzoesan sodu, wersenian disodowy, likazyna 80/55, etanol 96% 103,0 mg/5 ml, kwas cytrynowy bezwodny, amarant, karmel, lewomentol, zapach z wiśni i owoców granatu, sorbitol (roztwór 70%), cyklamian sodu, sól potasowa acesulfamu, woda oczyszczona.
Nie zawiera cukru.

Działania

Robitussin Antitussicum jest syropem zawierającym 7,5mg/5ml substancji czynnej - bromowodorku dekstrometofanu o działaniu przeciwkaszlowym. Hamuje suchy, męczący kaszel. Substancja ta bardzo dobrze wchłania się z przewodu żołądkowo-jelitowego. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem. Preparat działa w przeciągu pół godziny po podaniu doustnym i utrzymuje swoje działanie do 6 godzin.

Wskazania - Robitussin Antitussicum syrop na suchy kaszel, 100 ml

Leczenie objawowe suchego, męczącego kaszlu.

Przeciwwskazania - Robitussin Antitussicum syrop na suchy kaszel, 100 ml

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia, leczenie inhibitorami MAO, ciężka niewydolność wątroby.

Przeciwwskazania - Robitussin Antitussicum syrop na suchy kaszel, 100 ml

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, bóle żołądka)
- zawroty głowy
- senność

Uwagi

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także osłabia sprawność psychoruchową (pływanie, praca na dużej wysokości i inne).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.