

Romazic 10 mg 30 tabletek

Nasza cena: 3,06 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | 0,01G |
| Opakowanie | *30 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek na receptę |
| Substancja czynna | ROSUVASTATINUM |

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Leczenie hipercholesterolemii:

- pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych
- rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym:

- pierwotna profilaktyka dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia, w połączeniu z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Dawkowanie:

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Leczenie hipercholesterolemii:

- zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg, doustnie, raz na dobę. Jeżeli występuje taka konieczność dawkę można zwiększyć, jednakże nie wcześniej niż po 4 tygodniach leczenia poprzednią dawką.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym:

- zaleca się stosowanie dawki 20 mg raz na dobę.

W celu zapoznania się ze sposobem użycia produktu przez dzieci i młodzież do 18 roku życia należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działanie:

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduklazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu. Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL. hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Skład:

1 tabletkę zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej).

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów:

- z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną,
- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
- w ciąży,
- w okresie karmienia piersią,
- u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod antykoncepcji,
- z miopatią,
- jednocześnie leczonych cyklosporyną,
- z niedoczynnością tarczycy,
- z genetycznie uwarunkowaną chorobą mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić różnego rodzaju działania niepożądane do najczęstszych należą:

- cukrzyca,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- kaszel,
- duszność,
- zaparcia,

- nudności,
- bóle brzucha,
- bóle mięśni,
- krwimocz,
- osłabienie.

W celu poznania innych działań niepożądanych jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku należy zapoznać się z ulotką informacyjną bądź też skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.