

Rowatinex 30 kapsułek



Nasza cena: 14,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	ROWA-WAGNER K.G.ARZNEIMITTELFABRIK NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Rowatinex jest lekiem o działaniu moczopędnym.

Wskazania:

Preparat stosowany pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. piasku nerkowego).

Działanie:

Rowatinex jest lekiem, który działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych złogów kamieni nerkowych.

Działanie niepożądane:

U niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić lekkie, przejściowe objawy ze strony żołądka, np.: nudności. W przypadku wystąpienia wymiotów lub utrzymywania się innych objawów należy przerwać stosowanie leku.

Dawkowanie:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu.

Skład:

Jedna kapsułka zawiera:

Alfa - pinenum - 24,8 mg,

Beta - pinenum - 6,2 mg,

Camphenum - 15,0 mg,

Cineolum - 3,0 mg,

Fenchonum - 4,0 mg,

Borneolum - 10,0 mg,

Anetholum - 4,0 mg

Substancje pomocnicze:

olej z oliwek - 33,0 mg,

Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), żółcień pomarańczowa FCF 85% (E 110), żółcień chinolinowa WS 70% (E 104).

Uwagi:

W przypadku wystąpienia objawów bólowych, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolki nerkowej, zaburzeń w oddawaniu moczu, krwiomoczu, itp. należy skonsultować się z lekarzem.

Leku nie należy stosować u dzieci.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowatinex,

- ciąży,

- okresu karmienia piersią,

- ostrych lub przewlekłych schorzeń nerek.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.