

## Rowatinex, 50 kapsułek



Nasza cena: 27,18 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	KAPS.
Producent	ROWA-WAGNER K.G.ARZNEIMITTELFABRIK NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

### Opis produktu

#### Opis

### Rowatinex, 50 kapsułek

Preparat o działaniu moczopędnym.

### Działanie

Rowatinex jest lekiem, który działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych złogów kamieni nerkowych.

### Wskazania - Rowatinex, 50 kapsułek

Preparat stosowany pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. piasku nerkowego).

### Dawkowanie - Rowatinex, 50 kapsułek

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu.

### Składniki - Rowatinex, 50 kapsułek

Jedna kapsułka zawiera:  
Alfa - pinenum - 24,8 mg,  
Beta - pinenum - 6,2 mg,

Camphenum - 15,0 mg,  
Cineolum - 3,0 mg,  
Fenchonum - 4,0 mg,  
Borneolum - 10,0 mg,  
Anetholum - 4,0 mg  
Substancje pomocnicze:  
olej z oliwek - 33,0 mg,

Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), żółcień pomarańczowa FCF 85% (E 110), żółcień chinolinowa WS 70% (E 104).

## Przeciwwskazania - Rowatinex, 50 kapsułek

Nie stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowatinex,
- ciąży,
- okresu karmienia piersią,
- ostrych lub przewlekłych schorzeń nerek.

## Możliwe działania nieporządane - Rowatinex, 50 kapsułek

U niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić lekkie, przejściowe objawy ze strony żołądka, np.: nudności. W przypadku wystąpienia wymiotów lub utrzymywania się innych objawów należy przerwać stosowanie leku.

## Uwagi

W przypadku wystąpienia objawów bólowych, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolki nerkowej, zaburzeń w oddawaniu moczu, krwimoczcu, itp. należy skonsultować się z lekarzem.

Leku nie należy stosować u dzieci.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**