

Sachol Fast Effect, butelka 20ml, aerozol



Nasza cena: 25,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Sachol Fast Effect, butelka 20ml, aerozol

Sachol Fast Effect to **wyrób medyczny** w formie sprayu w butelce z dozownikiem. Przeznaczony jest do stosowania w jamie ustnej, łagodzi dyskomfort i ból związany z aftami i aftowym zapaleniem jamy ustnej, a także ułatwia gojenie aft. Sachol Fast Effect nie zawiera alkoholu (nie powoduje pieczenia), parabenów oraz cukru. Wykazuje skuteczne działanie barierowe, pozwalając na zmniejszenie bólu towarzyszącego aftom i ułatwia gojenie owrzodzenia. Ma miętowy aromat.

Postać

Spray do stosowania w jamie ustnej

Wielkość opakowania

20ml, butelka z dozownikiem

Opis wyrobu

Sachol Fast Effect:

- spray na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej,
- łagodzi dyskomfort i ból,
- ułatwia gojenie aft,
- nie zawiera alkoholu (nie wywołuje pieczenia),

- nie zawiera parabenów,
- bez cukru,
- dzięki specjalnemu składowi spray wykazuje skuteczne działanie barierowe, umożliwiając zmniejszenie bólu w miejscach afty i ułatwia gojenie owrzodzenia,
- zawiera aromat miętowy.

Składniki

Woda, ksylitol, gliceryna, wyciąg z płatków róży damasceńskiej, polisorbat 20, aromat miętowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, stewia, guma ksantanowa, polikarbofil, kwas mlekowy, pantenol, sól sodowa kwasu hialuronowego, wyciąg z liści aloesu zwyczajnego.

Stosowanie

Umieścić dozownik nad obszarem zmienionym chorobowo i nałożyć wyrób. Stosować dwa razy dziennie (lub w razie potrzeby częściej), pomiędzy posiłkami, przez tydzień lub do momentu ustąpienia objawów. Zaleca się powstrzymanie od jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po nałożeniu, aby ułatwić przyleganie wyrobu do błony śluzowej.

Ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania tego wyrobu u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.

- Wyrób jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej.
- Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości na jeden lub więcej składników wyrobu.
- Jeśli pacjent aktualnie stosuje, niedawno stosował lub planuje stosować inne leki, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Zaleca się stosowanie wyrobu przynajmniej 2 godziny po zażyciu leków lub suplementów.
- Jeśli objawy nie ulegną złagodzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Zamknąć opakowanie po każdym użyciu.
- Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem.
- Termin ważności zamieszczony na opakowaniu dotyczy nienaruszonego opakowania wyrobu, który jest prawidłowo przechowywany.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.
- Nie używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.
- Nie należy przyjmować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Wyrób należy używać zgodnie z instrukcjami.
- Wyrób należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami.

Przechowywanie

Preparat należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. poniżej 25 °C. w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Należy zużyć w ciągu 14 dni od pierwszego otwarcia

Producent

Farmaceutici Procemsa S.p.A.
Via Mentana 10 - 10042 Nichelino (TO)
Włochy

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcji

Bausch&Lomb Poland sp. z o.o.
Aleja Szucha 13/15
00-580 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.